

آتولول - سبحان

جرحی (بیهوشی عمومی) • میاستنی گراویس (نوعی خسف عضلانی) • نارسایی شریانی
مائدن بیماری رینود و بیماری عروق محیطی • دیابت • پسوریازیس (نوعی بیماری بوستی)

روش مصرف مناسب این دارو:

• دارو را دقیقاً طبق دستور پزشکان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شیوه در مورد مقدار و روشن صرف با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. • این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید. • برای چلچله‌گردی از خطا، دارو را در زمان معین خود مصرف کنید. • از قطعه تاگه‌خانی دارو بدون دستور پزشک خودداری ننمایید. • این دارو برای کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نشده است. • ممکن است پزشکتان دوز کمتری را برای سالمندان، بیماران کلیسوی و یا کبدی تجویز نماید.

دوز فراموش شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض یاد آوردن، اثرا مصرف نمایید. با اینحال اگر نزدیک زمان دوز بعدی به یاد آورید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شوید و به رژیم منظم قبلی برگردید. هرگز دوز دارو را به چهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید. مصرف بیش از حد دارو می‌تواند منجر به عوارض مانند کامش ضربان قلب، افت فشار خون، احساس گرفتگی در قفسه سینه به دلیل گرفتگی عضلات اطراف مجازی تنفسی یا گاهی از دست دادن هوشیاری گردد.

هشدارها و اختیارات:

• در صورت برخورد عوارض جانبی جدی و نادر زیر مصرف دارو را قطع و به پزشک مراجعت نمایید: بروات جلدی و حارش بسته؛ مشکلات تنفسی؛ نارسایی قلبی شامل تنفس سریع، خستگی، ضعف و تورم پاها و قوزکها. • اگر آتولول را برای دست کارکرد مصرف کردید، بعد از مصرف آن بیرون دستور پزشک خودداری نمایید. ممکن است لازم باشد قطع مصرف دارو به تدریج طی ۷ تا ۱۴ روز تجویز گیرد. • اگر نارسایی در عملکرد کلیه دارید، ممکن است پزشکتان دوز کمتری تجویز نماید. • مصرف فرآورده های کلکی ممکن است سبب افت فشار خون گردد لذا ضمن درمان از مصرف الكل خودداری نمایید.

• اگر هکام درمان دچار عوارضی منسد سرپیچه و خستگی شدید، از رانندگی و کار با ابزار آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو در اثرات ناخواسته در یک دوز نمی‌کند اما در صورت برخورد هر مشکلی به پزشک خود مراججه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به مرأت کمتر از عوارض عدم معرفت آنها می‌باشد.

• عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک بد مورد: کاهش ضربان قلب، افت فشار خون و وضعیتی، سردی انتهای انداخته، تعریق، سوهاءصم، تهوع، اسهال، سرگیجه و سرکیسر، تنگی نفس، خس خس سینه، گیجی، افسردگی و پا درد

• عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک بد مورد: افزایش سطح اتزیز های کبدی و اختلال خواب ناشی از درهای ضد ضد فشار خون ناشی از داروهای همار کننده گیرنده بتا بیانی به نگرانی در استی عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکبرت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.

• عارض دیگری که برای نیامده است ممکن است در برخی از بیماران بروز کنند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

در دهای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکtor قاطمی غربی، شماره ۲۹۵، کد پستی ۱۴۱۸۱۶۸-۵۳۶۹۵

تلفن رسیدگی به شکایات: (۰۳۱۸۸۳۶۱۹)

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com

نام ژئوگرافیک: آتشخانه

شکل دارویی: قرص روکی شما پس از مصرف مواد مسدود مینماید. اگر به نکسه‌ای نامقهوم

متالعه و درک اطلاعات پزشکی در مورد این دارو نیاز دارید با پزشک یا داروساز خود

برخورد کردید یا به اطلاعات پیشتری در مورد این دارو نیاز دارید با پزشک یا داروساز خود

مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری

فیلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران

خودداری کنید. در تضمیم گیری برای مصرف یک دارو باید خطوات آن در مقایسه فواید

حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد آتولول موادر ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتیکه سابقه هر گونه واکنش غیرعادی یا الرژیک به داروی آتولول دارید و هیچین

در صورت داشتن مشکلات مخصوصی مثل مسکلای مفاصل گذشتارهای مساوی گذشتارهای سایر اندامات

پزشک خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف این دارو شامل موادر ذیل می‌باشند: واکنش

افراشناستی که به آتولول یا سایر محتویات دارویی (برسادی کارده) می‌شود

مشکلات قلبی که با ضربان ساز (pacemaker) درمان شود

مشکلای خون پایین (endocarditis) که با لپل ضعف گردش خون اندام تحتانی منتهی نشده

فشار خون پایین (hypotension) که می‌تواند با ابتلاء قلبی می‌شود

مشکلات قلبی که در گردد خون خود فرد احتلال ایجاد نماید

فکورکوموپستیون (fusiform fistula) که در شما منع نماید

صرص این دارو را در شما منع نماید

حالمگی:

در صورت بارداری یا قصد باردار شدن، قبل از مصرف دارو یا پزشک یا داروساز خود مشورت

نمایید. این دارو را در شش ماه اول بارداری تأیید مصرف نمود و در سه ماهه آخر بارداری نیز

با دستور و پایش پزشک معاجل قابل مصرف می‌باشد.

شیریده:

این دارو در شیر مادر ترشح می‌گردد، لذا مصرف آن فقط با نظر پزشک امکان پذیر می‌باشد.

اطفال:

اطفال کافی چهت استفاده در اطفال زیر ۱۲ سال انجام نشده است.

مالکات کافی چهت استفاده در اطفال زیر ۱۲ سال انجام نشده است.

سالمندان: ممکن است مصرف دارو در سالمندانی که نارسایی عملکرد کلیه دارند، کاهش باید.

صرف همه‌ها با سایر داروهای:

اگر همراهان با این دارو، هر دارویی ختی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل و عواملی با

غذایی را مصرف کنید یا خیریا مصرف کرده باشد، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.

مخصوصاً مهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد زیرا ممکن

است نیاز به تنظیم مجدد دوز مصرفی دارو باشد:

*کلوبنیدن: اگر کلوبنیدن را همراه با آتولول مصرف می‌کنید، از قطع تاگه‌هایی مصرف

کلوبنیدن خودداری نمایید. قطع مصرف کلوبنیدن باستی طبق دستور العمل پزشک انجام

گیرد. *دلبلاتین، نیکوپینین و ورایامین: داروهای مهار کننده کانال کاسیمی یا درمان فشار

خون با درد قفسه سینه، دیسپورایمید، کیشیدین و آسیدوارون: داروهای مهار کننده مواد استفاده در

اریتمی یا بی ظیفی در ریشم قلب *دیگوکسین *اوذرالین *دیسوپروفون و ایندوامتسین:

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی. *انسولین و داروهای ضد دیابت خوارکی *داروهای

مورد استفاده در گرفتگی بینی و سینوس یا سایر داروهای سرماخورانگی *داروهای بیهوده

عمومی مانند هالوتان: سایر بیماریها:

حضور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف آتولول را تحت تأثیر قرار دهد.

علمکن شود که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصاً موارد امده در ذیل را به

پزشک خود اطلاع دهید:

*آسم و الرزی یا سایر مشکلات انسدادی سیستم تنفسی. *آنژن بیرونیزنتال (نوی درد

قفسه سینه) که در اثر انتفاخ عروق قلب به وجود می‌آید. *نارسایی قلبی تحبت کنسرول

*بلوک دهیزی بطنی درجه ۱ *تیروتوکسیکوز ناشی از پر کاری غده تیروئید عمل