

## سیناکست

نام ژنریک: سیناکست

شکل دارویی: قرص روشن دارو

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد سیناکست موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

**موارد منع مصرف:**

در صورتیکه سابقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به داروی سیناکست دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف این دارو شامل موارد زیر می‌باشند: ● واکنش افزایش حساسیت به سیناکست یا سایر محتویات موجود در دارو ● هیپوکسمی شدید

**حاملیگی:**

در صورت بارداری و یا تصمیم به باردار شدن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. این دارو در زنان باردار به صورت کامل بررسی نشده است، لذا پزشکتان با توجه به مزایا و مضرات دارو تصمیم‌گیری می‌نماید.

**شیردهی:**

اطلاعات کافی از ترشح این دارو در شیر مادر در دست نمی‌باشد، لذا پزشکتان ممکن است مصرف این دارو را در دوره شیردهی قطع و یا در صورت ادامه درمان تغذیه با شیر مادر را قطع نماید.

**اطفال:**

ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.

**مصرف همراه با سایر داروها:**

اگر همزمان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی یا غذایی را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده اید، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. خصوصاً مهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد.

موارد ذیل می‌تواند روی عملکرد سیناکست اثر بگذارد:

- داروهای به کار رفته در درمان بیماریهای پوستی و عفونتهای قارچی مانند کتوکونازول، ایتراکانازول و واربیکونازول
- داروهای به کار رفته در درمان عفونتهای باکتریایی مانند تلیترومایسین، ریفاپیمسین و سیپروفلوکساسین
- داروهای به کار رفته در درمان بیماریهای ایدز و عفونت HIV مانند ریتوناویر
- داروهای به کار رفته در درمان افسردگی مانند فلوروکسامین
- سیناکست نیز بر روی کارکرد داروهای ذیل اثر می‌گذارد:
- داروهای به کار رفته در درمان افسردگی مانند آم‌تریپتیلین، ذزی‌پرامین، نورتریپتیلین و کلومیپرامین
- داروهای به کار رفته در درمان تغییرات ضربان قلب مانند فلکائینید و پروپرفانول

● داروهای به کار رفته در درمان افزایش فشار خون مانند متوپرولول

**سایر بیماریها:**

حضور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف سیناکست را تحت تأثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصاً موارد آمده در ذیل را به پزشک خود اطلاع دهید:

● انواع صرع: در صورت داشتن سابقه قبلی، احتمال بروز حمله افزایش می‌یابد.

● مشکلات کبدی

● نارسای قلبی

**روش مصرف مناسب این دارو:**

این دارو را دقیقاً طبق دستور پزشک خود مصرف کنید و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. این دارو فقط برای مصرف

خوراکی است و به همراه غذا و یا مدت کوتاهی پس از غذا میل نمایید. قرصها بایستی به طور کامل مصرف شود و از خورد کردن و یا جویدن دارو خودداری نمایید. پزشکتان در دوره درمان با توجه به آزمایشات انجام گرفته، وضعیت شما را بررسی و در صورت لزوم دوز مصرفی دارو را مجدداً تنظیم می‌نماید.

**دوز فراموش شده:**

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، هرگز مقدار مصرفی دارو را به جهت جبران دو برابر نکنید و از مصرف دوز فراموش شده منصرف شوید و به رژیم منظم قلبی برگردید. چنانچه سوالات بیشتری درباره روش مصرف این دارو دارید یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

**مصرف بیش از حد:**

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید. علائم احتمالی افزایش دوز شامل گز گز و مور مور اطراف دهان، گرفتگی و دردهای عضلانی و صرع (علائم هیپوکسمی) می‌باشد.

**هشدارها و احتیاطات:**

- با کاهش سطح خونی کلسیم ریسک بروز تشنج افزایش می‌یابد، لذا در صورت بروز علائم کاهش کلسیم سریعاً به پزشک خود مراجعه نمایید.
- در صورت کاهش فشار خون، تشدید نارسای قلبی و یا نامنظمی ضربان قلب حین درمان با پزشک خود مشورت کنید.
- حین درمان با سیناکست سطح کلسیم، فسفر و هورمون پاراتیروئید شما بایستی به صورت مرتب پایش گردد.

**عوارض جانبی:**

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به‌مراتب کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

● در صورت بروز عوارض ناخواسته ذیل سریعاً با پزشک خود مشورت کنید: گز گز و مور مور اطراف دهان، گرفتگی و دردهای عضلانی و تشنج (این علائم ممکن است به دلیل کمبود سطح کلسیم خون باشد).

● عوارض جانبی با شیوع بیش از یک به ۱۰ مورد: تهوع و استفراغ.

● عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک به ۱۰ مورد: سرگیجه، سردرد، احساس گز گز و مور مور، کاهش اشتها، درد عضلانی، ضعف، راش پوستی، کاهش سطح کلسیم، افزایش سطح پتاسیم، کاهش سطح تستوسترون، تشنج، سوزاخمه، اسهال، بیوست، درد شکمی، کمر درد، سرفه و تنگی نفس، عفونت دستگاه تنفس فوقانی و واکنش افزایش حساسیت (آنژیوادم و یا کهیر).

نیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.

عوارض دیگری که در بالا نیامده است ممکن است در برخی از بیماران بروز کند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

**شرایط نگهداری:**

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود. داروهای تاریخ مصرف گذشته یا داروهایی را که دیگر نیاز ندارید، نگهداری نکنید.

**دفتر مرکزی:**

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵، کد پستی ۵۳۴۹۵-۱۴۱۱۸

تلفن رسیدگی به شکایات: ۰۲۱-۳۱۸۸۴۶۱۹

ایمیل: Compliants@sobhandarou.com