

دیلیتیژل

نام ژنریک: دیلیتیازم

شکل دارویی: ژل موضعی

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم بخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تضمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد ژل موضعی دیلیتیژل موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتیکه سایقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به ژل موضعی دیلیتیازم یا هر شکل دیگری از این دارو دارید، از مصرف دارو خودداری نمایید. همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. منع مصرف خاص دیگری برای این دارو به دست نیامده است ولی با توجه به جذب مقداری از دارو، موارد منع مصرف شکل خوارکی دارو برای شکل موضعی نیز ذکر می‌گردد: سندروم سینوس بیمار • بلاک دهلیزی بطی درجه ۲ یا ۳ (به استثنای افرادی که خربان ساز بطی دارند) • فشار خون پایین • سکته قلبی حاد • احتقان ریوی

حامگلی:

صرف این دارو در بارداری توصیه نمی‌شود، لذا قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

شیردهی:

صرف این دارو در دوره شیردهی توصیه نمی‌شود، لذا قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

صرف همواه با سایر داروهای:

اگر همزمان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی و یا سایر داروهای موضعی یا اراضی و بدهاشت را مصرف می‌کنید و یا به تازگی مصرف نموده‌اید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. تداخل دارویی خاصی برای این دارو به دست نیامده است ولی با توجه به جذب مقداری از دارو، موارد تداخل دارویی شکل خوارکی دارو برای شکل موضعی نیز ذکر می‌گردد لذا مهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد: فلانتسرین، داترولن، کاربامازین، کینینین، میازدراولام، تریازولام، استاتین‌ها مثل لوواتستین، سیموزاستین، سایمیدین، دیگوکسین، سیکلوسوپورین، بتا-بالکرها مثل آتوسول و پروپرتوسول، مهار کننده‌ها یا القا کننده‌های متابولیسم کبدی مثل روپافین، بوپریون، کلونیدین، داروهای بی‌حسی، داترولن، داروهای ضد اریتمی، هر گونه داروی مسود مصرف در بیماریهای قلبی عروقی شامل فشارخون، آلدسلوکین، داروهای ضد جنون، ایمی‌پرامین یا دیگر داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای، فنوباریتال، فنی توئین، سیکلوسوپورین، توفیلین، داروهای مدر (ادرار آور) و کورتیکوستریوئیدها مانند پردنیزولون.

سایر بیماریها:

حضور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف ژل موضعی دیلیتیازم را تحت تأثیر قرار دهد، لذا مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود را به پزشک خود اطلاع دهید. هشدار در مورد بیماری خاصی برای شکل موضعی این دارو در دست نیست ولی با توجه

به جذب سیستمیک مقداری از دارو، علاوه بر مواردی که در قسمت "موارد منع مصرف" آمده مواردی از بیماریهایی که هم‌باشد باشد. اگر خبر داشته باشد ذکر می‌گردد: **• بیماریهای قلبی و عروقی • پورفیری (نوعی بیماری و راتئی خون)** **• بیماریهای کبدی • بیماریهای کلیوی • افسردگی • مصرف داروهای بیهوشی به دلیل جراحی • بیماریهای گوارشی • دیابت**

روش مصرف مناسب این دارو:

این دارو را طبق دستور پزشک خود مصرف کرده و در صورت هر گونه شیوه با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. این دارو فقط برای مصرف خارجی می‌باشد. مقدار کمی از ژل (۲/۵ تا ۲/۵ سانتیمتر) را روی انگشت خود قرار داده و در انتهای مقعد استعمال کنید. دوره درمان این دارو به وضعیت شاقع مقعدی شما بستگی دارد. دوره درمان معمول این دارو ۶ تا ۸ هفته می‌باشد، لذا در صورت نیاز به ادامه درمان با پزشک خود مشورت کنید.

صرف بیش از حد:

اگر سهوا مقداری از این دارو را بلعیدید، سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

هشدارها و احتیاطات:

این دارو فقط برای مصرف خارجی می‌باشد و از مصرف خوارکی آن خودداری نمایید.

به سایر بیماریها و عوارض جانبی مراجعه نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها بهمراه کتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد. عوارض جانبی با شو羞 کمتر از یک ۱۰ مورد:

• سردرد: به صورت معمول شدید نبوده و می‌توان با داروهای مسکن ساده مثیل استامینوفن، آنرا درمان نمود. اگر سردد بطرطف نشد یا مشکل ساز شد، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

• سرگیجه و یا احساس سبکی سر: مخصوصاً هنگام برخاستن از وضعیت نشسته و یا خوابیده، ممکن است بروز نماید. اگر شروع به احساس سرگیجه نمودید، بشیوه‌ای دراز بکشید تا این احساس بطرطف گردد.

• سوزوش یا خارش یا خونریزی مقدار: در صورت مشکل ساز شدن با پزشک خود مشورت کنید.

اگر عوارض دیگری را تجربه کردید که فکر می‌کنید ممکن است به دلیل مصرف این دارو باشد، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. نیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.

شرایط نگهداری:

دارو در بیخجال (دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد)، دور از نور و گرمای و دسترس اطفال نگهداری شود.

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵، کد پستی ۱۴۱۱۸-۵۳۶۹۵

تلفن رسیدگی به شکایات: (۰۱۳) ۳۱۸۸۳۶۹

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com