

# امپرازول

نام ژنریک: امپرازول

شکل دارویی: کپسول

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد امپرازول موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

## موارد منع مصرف:

در صورتیکه سابقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به داروی امپرازول دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف این دارو شامل موارد ذیل می باشد: • واکنش افزایش حساسیت به امپرازول یا سایر محتویات دارو • واکنش افزایش حساسیت به سایر داروهای مهارکننده پمپ پروتونی (مانند پانتوپرازول، لانسوپرازول، رابپرازول و اس امپرازول) • مصرف داروی نلفیناپیر (ضد ویروس HIV)

## حاملگی:

در صورت بارداری یا قصد باردار شدن، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

## شیردهی:

این دارو در شیر مادر ترشح می گردد، لذا در صورتی که در دوره شیردهی به سر می برید، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. البته به نظر می رسد مقدار مصرف معمول دارو اثری منفی بر شیرخوار نداشته باشد.

## سالمدان:

مصرف دارو در سالمندان و افراد لاغر احتمال بروز عوارضی مانند گیجی را افزایش می دهد، لذا پزشکتان ممکن است دوز کمتری برای درمان تجویز نماید.

## مصرف همراه با سایر داروها:

اگر همزمان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی یا غذایی را مصرف می کنید یا اخیراً مصرف کرده اید، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. مخصوصاً مهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد:

- کتوکونازول، ایتراکانازول، بوساکونازول و یا واریکونازول (ضد قارچ) • دیگوکسین (داروی قلبی)
- دیازپام (جهت درمان اضطراب، گرفتگی عضلانی و تشنج) • فنیتوئین (ضدصرع) • ضد انعقادها مانند وارفارین و یا سایر مهارکننده‌های ویتامین کا • ریفامپین (انتی‌بیوتیک جهت درمان بیماری سل) • آنازاناویر (ضد ویروس HIV) • تاکرولیموس (مورد استفاده در پیوند اعضا)
- گیاه علف چای (هایپریکوم پفوراتوم یا سنت جونز وارت) • سیلوستاژول (درمان لنگش متناوب) • سسکویناویر (ضد ویروس HIV) • کلوپیدوگورل (ضد انعقاد) • ارلوتینیب
- متوتروکسات

## سایر بیماریها:

این دارو ممکن است علائم سایر بیماریها را پنهان نماید. اگر قبل و یا حین درمان مشکلات ذیل بروز نمود، به سرعت با پزشک خود مشورت کنید:

- کاهش وزن و یا اشکال در بلع • دل درد و یا سوءهاضمه • استفراغ غذا و یا خون • مدفوع سیاه و یا خونی • اسهال پایدار و یا شدید (مصرف این دارو ریسک بروز اسهال عفونی را افزایش می‌دهد)

## روش مصرف مناسب این دارو:

• دارو را دقیقاً طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. • این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید. • پزشکتان مقدار و روش مصرف دارو را با توجه به سن و وضعیت بیماری شما تعیین می کند. • جهت مصرف دارو بعد از تکمیل دوره درمان با پزشک خود مشورت کنید. • اگر بلعین دارو برای شما و یا کودکان مقدور نبود، کپسول را به آرامی باز کنید و محتویات آن را با یک لیوان آب یا آب میوه اسیدی (مانند آب سیب، پرتقال و آناناس) مخلوط و میل کنید. • برای اطمینان از مصرف کامل دارو نیز مقدار نصف لیوان آب را داخل لیوان مذکور برگردانید و سپس آن را بنوشید. • از جویدن گرانول‌های داخل کپسول خودداری نمایید.

## دوز فراموش شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نمایید. با اینحال اگر نزدیک زمان دوز بعدی به یاد آوردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شوید و به رژیم منظم قبلی برگردید. هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

## مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده به سرعت با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

## هشدارها و احتیاطات:

• مصرف درازمدت دارو (بیش از یکسال) نیاز به بررسی‌های منظم پزشکی دارد و در صورت بروز هر گونه علائم جدید و یا غیر طبیعی با پزشک خود مشورت نمایید.

• مصرف طولانی این دارو (مانند سایر مهارکننده‌های پمپ پروتونی) احتمال بروز شکستگی‌های لگن، معج و یا ستون فقرات را اندکی افزایش می‌دهد. اگر پیوستگی استخوان دارید و یا داروهای کورتیکواستروئید مصرف می‌کنید، حتماً با پزشک خود مشورت کنید.

• در صورت بروز بثورات جلدی و یا واکنش افزایش حساسیت، مصرف دارو را قطع و با پزشک خود مشورت نمایید.

• از مصرف دارو در کودکانی که زیر یکسال می باشند و یا وزن کمتر از ۱۰ کیلوگرم دارند، خودداری نمایید.

• به طور معمول این دارو بر توانایی شما در رانندگی و کار با ابزارآلات تاثیر خاصی ندارد ولی اگر عوارض ناخواسته‌ای مانند سرگیجه و خواب‌آلودگی بروز نمود، از انجام این گونه اعمال خودداری نمایید.

• یکی از عوارض نادر این دارو (مصرف بیش از سه ماه) کاهش سطح منیزیم خون می باشد که علائمی مانند خشکی، تپش قلب، انقباضات عضلانی غیرارادی، عدم آگاهی، تشنج و یا سرگیجه دارد. در صورت بروز علائم فوق مصرف دارو را قطع و به پزشک خود مراجعه کنید، زیرا ممکن است نیاز به بررسی سطح املاح (الکترولیتهای) خون باشد.

## عوارض جانبی:

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای سبکی اثرات ناخواسته می باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به‌مراتب کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

• عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک به صد مورد: سردرد، دل درد، اسهال، یبوست، نفخ، تهوع و استفراغ.

• عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک به صد مورد: سرگیجه، احساس سوزن سوزن شدن، خواب‌آلودگی، بی‌خوابی، گیجی، تغییر سطح آهن‌یمهای کبدی، راش پوستی، کهیر، خارش، خشکی و تورم اندامها.

• در صورت بروز عوارض نادر و جدی زیر به سرعت با پزشک خود مشورت کنید و یا به مراکز درمانی مراجعه نمایید:

• واکنش افزایش حساسیت (خس خس ناگهانی سینه، تورم لبها، زبان، گلو و یا بدن، راش پوستی، غش کردن و یا اشکال در بلع)، سندروم استیون جانسون یا نکرز سمی اپیدرمال (قرمزی، تاول، جدا شدن پوست و یا خونریزی از لبها، دهان، چشمها و دستگاه تناسلی خارجی) و مشکلات کبدی (زردی پوست، تیرگی ادرار و خشکی)

• نیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می کنند.

• عوارض دیگری که در بالا نیامده است ممکن است در برخی از بیماران بروز کند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

## شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود. برای حفظ دارو از رطوبت، کپسولها را در بسته‌بندی خود نگهدارید و درب قوطی حاوی آن را بعد از مصرف ببندید.

## دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر قاطعی غربی، شماره ۲۹۵، کد پستی ۵۳۳۶۹۵-۱۴۱۱۸  
تلفن رسیدگی به شکایات: ۳۱۸۸۳۶۹ (۰۲۱)

ایمیل: [Complaints@sobhandarou.com](mailto:Complaints@sobhandarou.com)