

اکس کارپین

نام ژنریک: اکس کارپازین

شکل دارویی: قرص روکش دار

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌های نامفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری قلبی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد اکس کارپین موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتیکه سابقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به داروی اکس کارپازین دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف این دارو شامل موارد ذیل می‌باشند: • واکنش افزایش حساسیت به اکس کارپازین یا سایر محتویات دارو

حاملیگی:

کنترل حملات صرع در دوره بارداری اهمیت دارد لذا در صورت بارداری یا قصد باردار شدن شما با پزشک خود مشورت کنید. مصرف داروهای ضد صرع نیز ممکن است برای جنین عوارض ناخواسته ای داشته باشد لذا پزشکتان با توجه به منافع و مضرات احتمالی، دارو را تجویز می‌کند. در طول بارداری مصرف دارو را بدون بررسی پزشک متوقف نکنید.

شیردهی:

در صورتی که در دوره شیردهی به سر می‌برید، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید. این دارو در شیر مادر ترشح می‌گردد لذا مادرانی که این دارو را مصرف می‌کنند، نباید به فرزند خود شیر دهند.

مصرف همراه با سایر داروها:

اگر همزمان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی یا غذایی را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده اید، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. مخصوصاً مهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد:

• داروهای ضد بارداری هورمونی مانند قرصهای خوراکی برای جلوگیری از بارداری

• سایر داروهای ضدصرع مانند کاربامازپین، فنوباریتال، فنی توفین و لاموتریزین

• داروهای کاهنده سدیم خون مانند مدرها، دسموپرسین و داروهای ضد التهاب استروئیدی (مانند ایندومتاسین)

• لیبتین و مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز (مانند ایزوکربوکسازید، سلزلیپین و فلزین) جهت درمان اختلالات خلقی

• داروهای مهار کننده سیستم ایمنی مانند سیکلوسپورین و تاکرولیموس

سایر بیماریها:

حضور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف اکس کارپازین را تحت تأثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر دقیقاً مخصوصاً موارد آمده در ذیل را به پزشک خود اطلاع دهید:

• سابقه واکنش افزایش حساسیت به کاربامازپین: اگر حساسیت غیر طبیعی به کاربامازپین دارید، ۲۵ درصد احتمال دارد که به اکس کارپین نیز حساسیت نشان دهید. • بیماری کلیوی • بیماری کبدی جدی • مصرف داروهای مدر در بیماریاری که احتیاس مایعات دارند • بیماری قلبی، تنگی نفس و تورم پاها در نتیجه تجمع مایعات

روش مصرف مناسب این دارو:

• دارو را دقیقاً طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید، حتی اگر با دستور دارویی موجود در بروشور متفاوت باشد و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. • این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید. • این دارو را می‌توانید قبل و یا بعد از غذا میل نمایید. • ممکن است پزشکتان در مورد مصرف این دارو دستور خاصی داشته باشد (برای مثال ممکن است با دوز پایین شروع نماید و سپس با افزایش تدریجی به دوز مناسب و موثر افزایش دهد). • این دارو به طور معمول در دو دوز منقسم تجویز می‌گردد. • همیشه دوره درمان را طبق دستور پزشک کامل نمایید. • اگر از نارسایی کلیوی یا کبدی رنج می‌برید، برای تنظیم دوز دارو با پزشک خود مشورت کنید. • بدون دستور پزشک از تغییر دوز و یا قطع مصرف دارو خودداری کنید.

دوز فراموشی شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نمایید. با اینحال اگر نزدیک زمان دوز بعدی به یاد آوردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شده و به رژیم منظم قبلی برگردید. هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید. در صورت فراموشی چند دوز از دارو با پزشک خود مشورت کنید.

مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید. مصرف بیش از حد دارو می‌تواند منجر به عوارضی مانند خواب‌آلودگی، سرگیجه، تهوع، استفراغ، افزایش حرکات کنترل نشده، رخت، گیجی، پرش عضلانی، افزایش حملات صرع، عدم تعادل و یا حرکات غیر طبیعی چشم گردد.

هشدارها و احتیاطات:

در صورت بروز عوارض ناظر زیر به سرعت با پزشک خود مشورت کنید و یا به مراکز درمانی مراجعه نمایید:

• واکنش افزایش حساسیت (مانند سایر داروها) شامل علائمی مانند تورم لب‌ها، پلک‌ها، صورت و گلو، اختلال تنفسی، تب به همراه تورم غدد و ضایعات پوستی و تاول می‌باشد.

• علائم شبه آنفولانزا همراه با زردی پوست یا ملتحمه چشم که ممکن است نشانه‌ای از هپاتیت دارویی باشد.

• افزایش بروز حملات صرع در کودکان نیاز به بررسی فوری توسط پزشک دارد.

• کاهش احتمالی اختلالات خونی (کاهش سطح گلبول‌های سفید، قرمز یا پلاکت) مانند خستگی، تنگی تنفس حین ورزش، رنگ پریدگی، سردرد، سرگیجه، لرز، تب ناشی از عفونت مکرر، گلودرد، زخم دهانی، خونریزی یا کبودی، خونریزی از بینی، ضایعات پوستی متمایل به قرمز یا ارغوانی و یا جوش‌های چرکی پوست را مشاهده کردید.

• داروهای ضد صرع مانند اکس کارپازین ممکن است در موارد نادری منجر به افکار خودآزاری و خودکشی گردد. در صورت بروز این افکار بلافاصله با پزشک خود مشورت کنید.

• جوش‌های قرمز (به ویژه در صورت) خستگی، تب، تهوع و بی‌اشتهایی ممکن است علائمی از لوپوس دارویی باشد.

• بی‌حالی، گیجی، انقباض عضلانی تکرار شونده و تشدید صرع ممکن است علائمی از کاهش سدیم خون (هیپوناترمی) باشد.

• درد ناحیه قوفانی شکم، تهوع و بی‌اشتهایی ممکن است علائمی از التهاب لوزالمعده (پانکراتیت) باشد.

• افزایش وزن، خستگی، ریزش مو، ضعف عضلانی و احساس سرما خوردگی ممکن است علائمی از کم کاری غده تیروئید باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به مراتب کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

• عوارض جانبی با شیوع بیش از یک به ده مورد: سرگیجه، خواب‌آلودگی، سردرد، خستگی، تهوع، استفراغ و یا دوبینی

• عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک به ده مورد: درد شکمی، بی‌وست، اسهال، افزایش وزن، ضعف، کاهش تمرکز، فراموشی، کم‌توجهی، بی‌تفاوتی، تحریک پذیری، گیجی، اختلال در تعادل، لرزش، تاری دید، اختلال بینایی، راش پوستی، ریزش مو و آکنه.

نیاز به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.

عوارض دیگری که در بالا نیامده است ممکن است در برخی از بیماران بروز کنند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵، کد پستی ۰۵۴۶۹۵-۱۴۱۱۸

تلفن رسیدگی به شکایات: ۰۲۱۸۸۳۶۱۹ (۱۰۲)

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com