

## پریمیدون

نام ژئریک: پریمیدون

شکل دارویی: قرص خط دار

متالله و درک اطلاعات ذبل برای شما پسیار سومدن می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامه‌فهم بخورد

کردید یا به اطلاعات پیشتری در مورد این دارو نیاز دارد بپزشک با داروساز خود مشورت کنید.

قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در

تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو منجذبه شود. در مورد پریمیدون مواد ذبل باید در نظر گرفته شوند:

### موارد منع مصرف:

در صورتیکه سایقه هر گونه و اکشن غیرعادی یا آرزیک بدارو پریمیدون باشد. اگر به نکته‌ای نامه‌فهم بخورد

صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد تهدیدنده با رنگها، به پزشک خود

اطلاع دهد. موارد منع مصرف این دارو شامل مواد ذبل می‌باشد: **•** اکشن افزایش حساسیت به پریمیدون، فوبیاها یا سایر محتویات دارو **•** پورفری متناوب حاد (نوعی بیماری متابولیک

وراثی)

### حاملگی:

اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید

زیرا مصرف این دارو ممکن است سبب بروز هنجاری جنینی (مانند لب شکری، کام شکری،

مشکلات قلبی و تاجه تناسلی) گردد و پیشکشان با توجه به مسامی و مضرات بالقوه دارو تصمیم

می‌گیرد که مصرف دارو را با حداقال دوز ادامه دهد و با داروی دیگری را جایگزین کنید.

**•** مصرف داروهای ضد صرع مانند پریمیدون ممکن است سبب کمبود فولات گردد لذا برای رفع

این مشکل مکمل فوایت در دوره بارداری می‌تواند منجر به گردد.

**•** مصرف در دوره بارداری به حضوض می‌رسد ماهه اخیر بارداری می‌تواند متولد شده گردد.

**•** مصرف پریمیدون در دوره بارداری می‌تواند متجر به خوبیزی در نوزاد تازه متولد شده گردد.

برای اجتناب از این عارضه در ۴۴ ساعت اول پس از زایمان و بتامین کا بجاییز می‌گردد.

**•** پریمیدون ممکن است ایکوتیکسی قرص های ضد بارداری را کاهش دهد لذا برای استفاده از

روش های ضد بارداری مناسب با پزشک خود مشورت کنید.

### شیردهی:

برای مصرف دارو در دوره شیردهی با پزشک خود مشورت کنید زیرا ترشح دارو در شیر سبب

خواب آلودگی نوزاد می‌گردد.

### صرف همه راه با سایر داروها:

اگر همزنان با این دارو، هر دارویی تخته داروهای بدون نسخه، گیاهی با مکمل و تامینی با غذایی

را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده اید، به پزشک با داروساز اطلاع دهید. مخصوصاً مهم

است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد زیرا ممکن است نیاز به تنظیم

محدد دوز ضروری دارو باشد:

**•** سایر داروهای ضد صرع مانند کاربامازین، اتوکسوسیماید، اسکیمارازین، اسید والبرویوسک،

تیاگلین، تیرپاتیات، نوسنایید، لاوتورپین، فنی توین، **▪** ضد اعقادها مانند اوارفین، مباریپرات

ها و بنزودازپین ها (برای درمان بی خوابی)

**▪** ترکپیات مخدّر مانند متابون، اوسکی، کدون و

فتاپنیل (برای درمان درد های شدید با رفع عالم محرومیت از مواد **▪** انتی مانند تولیفین و موته لواست

متوفیدیات)، داکسی سیکلین و تلبتونوسپین داروهای ضد آسم مانند تولیفین و موته لواست

**▪** داروهای هرمونی مانند ضدبارداری هرمونین تیروئید **▪** مهار کننده های گردنده بتا

(داروهای ضد فشار خون) **▪** سیکلوسورین (داروی مهار کننده سیستم ایمنی برای جلوگیری از رد

پیوند اعضا) **▪** داروهای اعصاب و روان، خداخوازی گیا تثیت کننده خلق مانند لواسینیدون، ضد

افسردگی های سه حلقه ای، لاوتورپین، میاسرین، کوتیپین، سرترالین **▪** کوتیکوآستروپیدها

**▪** داروهای کمتوتاپی مانند سیکلوكسفامید، اتوپیزاد و دس تاصل **▪** مست جوز وارت یا گیاه علف

چای **▪** داروهای شبه نیترونی ای پیوندی **▪** الاتانین و داکلین از **▪** گروه داروهای ضد سوپرسوپیور،

اپدیسپیور، داکلانتوسپین، داپیوپور، تلپنیپور، ریپیوپور و کوبیستین **▪** داروهای ضد قارچ

مانند واپرکوتاپور، اسکارکوپور و پوساکوتاپور **▪** داروهای ضد ایقاند مانند ایکسپیان، داگیگاران،

روپارکسیان و تیکاگلور **▪** فولات یا ویتامین ب<sub>6</sub> **▪** داروهای همه کار کننده سیستم ایمنی مانند

سیکلوسورین (برای جلوگیری از رد پیوند اعضا) **▪** تاکرولیموس، اورلیموس و سیرولیموس

**▪** دفاسپریوس کس برای جلوگیری از تجمع آهن در بدن **▪** داروهای مورد استفاده در فیبروز کیستیک

مانند ایواکافتور **▪** داروهای قلبی مانند مهار کننده های کاتال کلسیم (نیمودین و نیقدین) **▪** داروهای ضد اینکل مانند پرازیکوتانل و الیندازول **▪** الکل

### سایر بیماریها:

حضور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف پریمیدون را تحت تأثیر قرار دهد

همچنین شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصاً موارد آمده در ذبل را به پزشک خود اطلاع هدید:

**▪** بیماریها که تفسی **▪** تارسایی کبدی **▪** تارسایی کلیوی **▪** بارداری **▪** سایه افکار خودآزاری و

خودکشی با صرف داروهای ضد صرع مانند پریمیدون

### روش مصرف مناسب این دارو:

**▪** دارو را دقیقاً طبق دستور پزشکان مصرف نماید و در صورت هر گونه شبهه با پزشک با داروساز

خود مشورت کنید. **▪** مقدار صرف با توجه به بیماری و سن فرد توسط پزشک تعیین می‌گردد

ممکن است پزشکان دارو را به تنهایی با همراه با سایر داروهای ضد صرع تجویز نمایند. **▪** از

قطع صرف دارو ب بدون دستور پزشک خودداری نمایید. **▪** این دارو را ب یک یوآن آب میل نمایید

**▪** سعی نکن دارو را در زمان تعیین شده مصرف کنید تا از بروز حمات جلوگیری گردد.

### دوز فراموش شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردی، به محض به بیان آوردن، آن را مصرف نمایید

هر گز دارو را به جهت جربان دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

### صرف بیش از حد:

در صورت مصرف اضافی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک با مرکز درمانی مراجعه نمایید.

### هشدارها و احتیاطات:

**▪** افاده کمی با مصرف داروهای ضد صرع مانند پریمیدون ممکن است دچار افکار خودآزاری و یا

خودکشی شوند. در صورت بروز چنین افکاری بالاصله با پزشک خود مشورت کنید.

**▪** مواد اداری از ضایعات یوستی خطرناک با مصرف پریمیدون گزارش دند اینست که در ایندا به

صورت لکه که ای قرمز یا گرد با تاول مادری بروز نماید که در ادامه با زخم های دهان، گلو،

بینی، تاجه تناسلی و تخته چشم همراه است. این بثورات چندی کننده حیات می‌باشد و اغلب

اغلب با علامت شیشه اتفاق موقتاً همراه است. در صورتی که این دارو را باشد. در سایه اینگونه مشکلات را به مصرف

پریمیدون با روابط پارسیان در برابر این صرف دارو باشد. در نهایت بروز خودآزاری نمایید.

**▪** مصرف این دارو ممکن است سبب بروز ای خوبیزی در نوزاد تازه متولد شده گردد.

**▪** مصرف پریمیدون در دوره بارداری می‌تواند متجر به خوبیزی در نوزاد تازه متولد شده گردد.

**▪** برای اجتناب از این عارضه در ۴۴ ساعت اول پس از زایمان و بتامین کا بجاییز می‌گردد.

**▪** پریمیدون ممکن است ایکوتیکسی قرص های ضد بارداری را کاهش دهد لذا برای استفاده از

روش های ضد بارداری مناسب با پزشک خود مشورت کنید.

### شیردهی:

برای مصرف دارو در دوره شیردهی با پزشک خود مشورت کنید زیرا ترشح دارو در شیر سبب

خواب آلودگی نوزاد می‌گردد.

### صرف همه راه با سایر داروها:

اگر همزنان با این دارو، هر دارویی تخته داروهای بدون نسخه، گیاهی با مکمل و تامینی با غذایی

را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده اید، به پزشک با داروساز اطلاع دهید. مخصوصاً مهم

است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد زیرا ممکن است نیاز به تنظیم

محدد دوز ضروری دارو باشد:

**▪** سایر داروهای ضد صرع مانند کاربامازین، اتوکسوسیماید، اسکیمارازین، اسید والبرویوسک،

تیاگلین، تیرپاتیات، نوسنایید، لاوتورپین، فنی توین، **▪** ضد اعقادها مانند اوارفین، مباریپرات

ها و بنزودازپین ها (برای درمان بی خوابی)

**▪** ترکپیات مخدّر مانند متابون، اوسکی، کدون و

فتاپنیل (برای درمان درد های شدید با رفع عالم محرومیت از مواد **▪** انتی مانند تولیفین و موته لواست

متوفیدیات)، داکسی سیکلین و تلبتونوسپین داروهای ضد آسم مانند تولیفین و موته لواست

**▪** داروهای هرمونی مانند ضدبارداری هرمونین تیروئید **▪** مهار کننده های گردنده بتا

(داروی مهار کننده سیستم ایمنی برای جلوگیری از رد

پیوند اعضا) **▪** داروهای اعصاب و روان، خداخوازی گیا تثیت کننده خلق مانند لواسینیدون، ضد

افسردگی های سه حلقه ای، لاوتورپین، میاسرین، کوتیپین، سرترالین **▪** کوتیکوآستروپیدها

**▪** داروهای کمتوتاپی مانند سیکلوكسفامید، اتوپیزاد و دس تاصل **▪** مست جوز وارت یا گیاه علف

چای **▪** داروهای شبه نیترونی ای پیوندی **▪** الاتانین و داکلین از **▪** گروه داروهای ضد سوپرسوپیور،

اپدیسپیور، داکلانتوسپین، داپیوپور، تلپنیپور، ریپیوپور و کوبیستین **▪** داروهای ضد قارچ

مانند واپرکوتاپور، اسکارکوپور و پوساکوتاپور **▪** داروهای ضد ایقاند مانند ایکسپیان، داگیگاران،

روپارکسیان و تیکاگلور **▪** فولات یا ویتامین ب<sub>6</sub> **▪** داروهای همه کار کننده سیستم ایمنی مانند

سیکلوسورین (برای جلوگیری از رد پیوند اعضا) **▪** تاکرولیموس، اورلیموس و سیرولیموس

**▪** دفاسپریوس کس برای جلوگیری از تجمع آهن در بدن **▪** داروهای مورد استفاده در فیبروز کیستیک

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترسی اطفال نگهداشی شود.

### دفتر مرکزی:

تلفن رسیدگی به شکایات: ۰۱۱۸-۵۳۶۹۱۰

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com

تلفن رسیدگی به شکایات: ۰۱۸۸۳۶۱۹

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com