

# ریواتکسی

نام ژنریک: ریواسیتگمین

شکل دارویی: کپسول

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد ریواتکس موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

## موارد منع مصرف:

در صورتیکه سابقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به داروی ریواسیتگمین دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف این دارو شامل موارد ذیل می‌باشند: • واکنش افزایش حساسیت به ریواسیتگمین، سایر مشتقات کاربامات‌ها (مانند نوستیگمین و داروناور) یا سایر محتویات دارو

## حاملگی:

برای مصرف دارو در دوره بارداری یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. پزشک دارو را با ارزیابی مزایا و مضرات احتمالی تجویز می‌نماید.

## شیردهی:

ایمنی ریواسیتگمین در دوره شیردهی ثابت نشده است لذا برای مصرف دارو در دوره شیردهی یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

## اطفال:

این دارو برای کودکان کاربردی ندارد.

## مصرف همراه با سایر داروها:

اگر همزمان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی یا غذایی را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده‌اید، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. مخصوصاً مهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد:

• داروهای آنتی‌کولینرژیک مانند اسکسیتین و تولترودین که اثراتی مشابه ریواسیتگمین دارند. داروهای آنتی‌کولینرژیک برای مشکلاتی مانند گرفتگی یا اسپاسم های مثانه یا دستگاه گوارشی، بیماری پارکینسون و بیماری مسافرت یا حرکت به کار می‌روند.

• متوکلوپرامید که جهت درمان علائمی تهوع و استفراغ استفاده می‌شود، ممکن است هنگام مصرف همراه با ریواسیتگمین سبب سفتی اندامها و لرزش دستها گردد.

• مصرف این دارو را قبل از اعمال جراحی به پزشک اطلاع دهید زیرا ممکن است سبب افزایش اثرات داروهای شل کننده عضلانی در بیهوشی گردد.

• مصرف داروهای مهار کننده گیرنده بتا (مانند آتنولول، متوپرولول، سوتالول و تیمولول) همراه با ریواسیتگمین، ممکن است سبب افت ضربان قلب (برادی کاردی) و کاهش سطح هوشیاری گردد. علاوه بر موارد قبلی مصرف همراه با سایر داروهای موثر بر ضربان و ریتم قلب (مانند دلتیازم، دیگوکسین و ییلوکارین) نیز بایستی با احتیاط انجام گیرد.

• سایر داروهای شناخته شده که بر ریتم قلب نیز اثر می‌گذارند: کلروپرومازین، هالوپریدول، پیموزاید، بنزامیدها مانند سولپیراید، سیتالوپرام، دیفن هیدرامین، مایتیل، اریتره‌تامین تریزین، ماسکوفکسانسین، هالوفانتین، میزولاستین، متادون و پنتامیدین

## سایر بیماریها:

حضور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف ریواسیتگمین را تحت تأثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصاً موارد آمده در ذیل را به پزشک خود اطلاع دهید: • ضربان قلب نامنظم و یا آهسته • ناراسی قلبی • سکنه قلبی • کاهش پتاسیم یا منیزیم خون • زخم معده فعال • اشکال در دفع ادرار • صرع • اسهال و یا بیماری شدید ریوی • ناراسی قلبی • ناراسی کبدی • لرزش • وزن کم بدن (کمتر از ۵۰ کیلوگرم)

## روش مصرف مناسب این دارو:

• دارو را دقیقاً طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. • این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید. • از خوردن و یا جویدن کپسول خودداری کنید. • مصرف همراه با غذا تحمل پذیری دارو را افزایش می‌دهد. • این دارو به طور معمول در دو دوز منقسم (صبح و شب) تجویز می‌گردد. • پزشکتان مقدار دارو را با توجه به تحمل پذیری و پاسخدهی فرد تعیین می‌کند. • ممکن است پزشکتان دوز دارو را به تدریج افزایش دهد تا دوز مطلوب حاصل گردد. • از قطع مصرف دارو بدون دستور پزشک خودداری و دوره درمان را نیز طبق دستور رعایت کنید.

## دوز فراموش شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شده و به رژیم منظم قبلی برگردید. هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

## مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً با پزشک خود مشورت کنید زیرا ممکن است نیاز به مراقبت های پزشکی داشته باشید. مصرف بیش از حد دارو می‌تواند منجر به عوارضی مانند تنگی مردمک چشم، گریغفگی، مده درد، تنگی نفس، افزایش ترشحات ریوی، بزاق دهان و اشک چشم، کاهش یا افزایش فشار خون، تهوع، استفراغ، اسهال، توم، کاهش ضربان قلب و غش کردن گردد. در موارد شدیدتر ضعف و پرش عضلانی، تشنج و قطع تنفس ایجاد می‌گردد. علاوه بر این مواردی از سرگیجه، لرز، سردرد، خواب آلودگی بیش از حد، گیجی و احساس ناخوشی گزارش شده است.

## هشدار ها و احتیاطات:

• میزان بروز و شدت عوارض جانبی با دوزهای بالاتر بیشتر است و قطع مصرف دارو نیز برای بیش از سه روز نیاز به مشورت با پزشک دارد.  
• عوارض جانبی (مانند فشار خون بالا و توم) در بیماری آرتراپر و علائم خارج هرمی مانند لرزش در بیماری دمانس همراه با پارکینسون) اندکی بعد از افزایش دوز مصرفی دارو مشاهده شده است که با کاهش دوز و یا قطع مصرف برطرف می‌گردد.  
• عوارض گوارشی مانند تهوع، استفراغ و اسهال وابسته به دوز می‌باشد و به ویژه با شروع درمان و یا افزایش دوز مصرفی بروز می‌نماید.

• این دارو ممکن است سبب کاهش وزن گردد لذا وزن شخص را در طول درمان کنترل نمایید.  
• مصرف این دارو در بیماران که سندرم سینوس بیمار یا اختلالات سیستم هدایتی قلب مانند بلاک های دهلیزی بطنی دارند، بایستی زیر نظر مستقیم پزشک انجام گیرد.

• ریواسیتگمین ممکن است سبب افزایش ترشح اسید معده گردد لذا در بیماران که زخم های معده یا دوازدهه دارند، بایستی با احتیاط مصرف گردد.

• ریواسیتگمین ممکن است سبب بروز عوارض تنفسی گردد لذا در بیماران که آسم یا بیماری های انسدادی ریه دارند، بایستی با احتیاط مصرف گردد.

• این دارو در بیماران که انسداد اداری یا تشنج دارند، بایستی با احتیاط مصرف گردد.  
• مصرف داروهای کولینرژیک همراه با ریواسیتگمین ممکن است علائم خارج هرمی (نوعی حرکات غیر طبیعی و غیرارادی) را افزایش دهد.

• مصرف دارو ممکن است سبب خواب آلودگی و سرگیجه گردد. در صورت بروز این علائم را رانندگی و کار با ابزارآلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

## عوارض جانبی:

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به مراتب کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

• عوارض جانبی با شیوع بیش از یک به ده مورد: احساس گیجی، کاهش اشتها، تهوع، استفراغ و اسهال  
• عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک به ده مورد: اضطراب، تعریق، سردرد، سوزش سردل، کاهش وزن، معده درد، برافروختگی، خواب آلودگی، احساس ضعف و خستگی، احساس ناخوشی، لرزش، احساس گیجی و کایوس شبانه  
• عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک به صد مورد: افسردگی، بی‌خوابی، غش کردن یا سقوط ناگهانی و افزایش آنزیم های کبدی

• در صورت بروز عوارض جانبی نادر زیر بافاصله با پزشک خود مشورت کنید: تشنج، درد قفسه سینه به خصوص با فعالیت، زخم های گوارشی، التهاب لوزالمعده (همراه با دل درد، تهوع و استفراغ)، بروز علائم مشابه پارکینسون و یا تشدید بیماری پارکینسون، ضربان قلب نامنظم و خونریزی گوارشی  
نیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.  
عوارض دیگری که در بالا نیامده است ممکن است در برخی از بیماران بروز کنند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

## شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، در نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

## دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵، کد پستی ۵۲۶۹۵-۱۴۱۱۸  
تلفن سیدگی به شکایات: ۰۲۱۳۸۸۳۶۹۹ (۰۱۳)

ایمیل: [Complaints@sobhandarou.com](mailto:Complaints@sobhandarou.com)