

زانیسرد

را هرگز به همراه نوشیدنی‌های الکلی مصرف ننمایید. در سالمندان و بیماران کبدی یا ایالویسی ممکن است پوشش‌گذاری کننده برای تدریج دوز را افزایش دهد تا آن بروز عوارض جانبی ناشواسته جلوگیری کردد. این دارو برای سینه ۱۰۸ سال توصیه شده است. این دارو برای ملهمهای کوتاه مدت تجویز می‌گردد (کمتر از ۱۲ هفته) و تجویز این دارو معمولاً برای ۴ هفته می‌باشد و ادامه و زدن درمان نیاز به برسی و دستور مجدد پوشش دارد. هرگز این دارو را با دستور پزشک و به طور نامناسب قطعی ننمایید.

زیرا معمولاً پوشش‌گذار این دارو را به تدریج قطعی نماید تا از اثرات پارکتی (Rebound effects) پیشگیری نماید.

**شکل دارویی:** فرض خط دار  
مالحه و درک اعلاءات دبل برای شما سیار سودمند می باشد. اگر به نکته های  
نامفهوم بخوبید کردید یا به اطلاعات پیشتری در مورد این دارو نیاز دارید با  
پژوهشکار از روابط ساز و خود شورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر  
گرفته شود. این دارو برای بیماری فلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن  
در مواد خواره سان سپاهیه نمایم که به دگران خودداری کنید. در تضمیم گیری برای  
مصرف کنید دارو باید خطرات ای از مقابله فاید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود.  
در زور ایسنس موارد دلایل باید در نظر گرفته شوند:

**فراخوش سمه:**  
اگر مصرف کن از دارو را فراموش کردی، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نمایید. با احتمال اگر تزدیک زمان دوز بعدي به یاد آورده باز مصرف دوز فراموش کنید. هرگز دوز دارو را به جهت مخفض شود و زیر نظم قلی برگردید.

**مصرف بیش از حد:**  
در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید. از عالائم مصرف بیش از حد این دارو میتوان خواب‌الودگی، گیجی، احساس سرمه، مشکلات تکمیلی یا لکنت زبان، افت فشارخون و مشکلات

**هشدارها و اختیارات:** قبیل از رانندگی و کار با ابزارآلات دقیق، خنما از میزان انحراف ناخواسته‌ای مانند خواب‌الویدیو، سرگیری و یا کاهش تمکر چنین مصرف این دارو در خود و یمنی کارهای مذکور مطمئن شود.

(قدیمی) اگر ساقه هرگونه عدم تتحمل هدروکربنها (قدنها) مانند عدم تحمل غالاکتوز

در صورت بروز عوارض جانبی نادر زیر دارو را قطع و سریعاً به پزشک کیا مراکز درمانی مراجعه نمایید: مشکلات عصبی و قفساری جدی مانند تحریک یابنی، بی رفقاری، پرگشاخشگری، غصه‌بیان: عقاید اشتیاه، کاؤس‌های شبانه، توهمندات و رفتارهای انماضی: مشکلات تغذیه سی با بلع، خس ناگهانی سینه، تورم پلکهای، صورت و یا لامپ، خارش و یا بیرونیات جلدی

۴) در صورت بروز عالائم زیر نیز سریعاً به پزشک مراجعت نماید: مشکلات حافظه  
 (امزی)، روزی پوست و یا ملتحمه چشم

۵) عالائم ایستگی و سوءِ حرارت موتی این دارو شامل سردید، درد عضلانی، اضطراب شدید، یقرازی، یکجیگانی، تغییرات خواب و یا تحریک پنیری (در موارد رعایت می‌باشد: مصرف طبلویانی مدت این دارو، مصرف دوز بالای آن،

قطع ناگاهی مصرف دارو، ساقه و استگی به داروها، مواد و یا الكل  
۲) علاج سوء محرومیت از این دارو در موارد شدیدتر شامل موارد زیر نیز می  
گردد: هضم، استفراغ، تعریق، کرامهای شکمی، احساسات غیرواقعی، حساسیت به  
صدایها و تماش، تخریج و یا گرگ اندازها، توهمات  
اعراض جانبی:

⇒ عوارض جانبی با شیوع بیش از ۵٪  
افسردگی، خواب آلودگی، پرس عضلانی، فراموشی، لکنت زبان، سرگیجه یا سبکی  
نمودن و درست شدن خشک دهان، خشکی چشم، ته ریزی، ته ریزی

لرزش، دوچیتی باز اندیخته، تهیق، پیروات خالی، تعمیرات و زن بدن نیازی به نگارش از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثراً مردم این دارو را بدون هیچ شکلی مصرف می‌کنند.

**نمره ایجاد نگهداری:** در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال ندارد. این موضع مواد جایی دیگری سیدی به پرسنل خود اخراج نمی‌کند.

دفتر مرکزی: نگهداری شود.

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com  
تلفن رسیدگی به شکایات: ۰۱۳۳۱۸۲۳۶۱۹

موارد منع مصرف.  
در سینماییکه سایه روی گونه و اکتش غیرعادی ای زیک به داروی اپرازولام دارد و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر یاده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا ریگها، پوشک خود اطلاع دهد. موارد منع مصرف این دارو شامل:  
■ اکتش افزایش حساسیت به اپرازولام یا سایر نزدیکابین ها و یا سایر محظیات

- م وجود در این دارو
- بیماری میاستنی گراویس که بیمار از ضعف شدید عضلانی رنج می‌برد.
- مشکلات شدید قفسه سینه یا مشکلات تنفسی

- مشکلات کبدی شدید
- اپنے حین خواب که به صورت تنفس نامنظم و یا حتی دوره‌های کوتاه قطع تنفس طی خواب خود را ازشان ممکن نمایند.

- مصرف این دارو بارداری ممکن است به جنین آسیب برساند، لذا هنگام بارداری، شکر یه آن و یا حسی تصمیم به بارداری قبل از مصرف دارو حتماً با برداشتن خود مشورت نمایید.

**شیردهی:** این دارو در دوره شیردهی نباید مصرف گردد، زیرا ممکن است که دارو در شیر مادر ترشیخ گردد.

**اخطال:** این دارو برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال توصیه نشده است.  
**مصرف خمره با سایر داروهای:** اگر همچنان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل

و پرسنلیتی پردازی می‌نماید و مکرر سی نمی‌نماید همچنان که بپرسید داروهای خود اطلاع می‌دهند. مخصوصاً مهم است که بپرسید شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشید:

- مسکن‌های قوی مانند دورفین، کدثین و پربوپکسی‌فنون
- داروهای آنتی سایکوتیک (ضد جنون) جهت درمان شیزوفرنی

- ضد صرعنها مانند کاریابازپس، فنی توئین و فنوبایتال
- آنتی هیستامینها جهت درمان واکنشهای حساسیتی
- ضد قارچها مانند کتوکونازول

- داروهای ضدبارداری خوارکی (کتراسپیوها)
- آنتی بیوتیکها مانند اریتروماسین

- سامنیدن جهت درمان رحمهای مده
- دیلیتازم جهت درمان آثرین صدری، فشار خون بالا
- دیگوکسین جهت درمان مشکلات قلبی مختلف

- ریتوناویر یا سایر داروهای مشابه (ضد ویروس HIV) سایر بیماریها:

سرور مسیر پیشگاه و سنداد پرسنلی سی جوانه ستر اپریلو. م رامست دیر  
قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پژوهشکی دیگر خود به خصوص موارد  
زیر را به پژوهش خود اطلاع دهید:

- سایه افسردگی که همراه با تغکرات خودگشی یا خودازاری باشد.
- سایه مشکلات روانپزشکی که درمان بیمارستانی به دنبال داشته است.
- مشکلات با سیما زنای، بده، کلمو، و با کیده،

■ سابقه سوء مصرف مواد، داروها یا الکل و یا همچنین احتمال بروز مشکلات حین قطع مصرف آنها، زیرا در چنین مواردی ممکن است پزشکتان درمانهای

- سایقه تجویز داروهایی جهت درمان اضطراب شدید، زیرا این داروها به مرور در بدن ایجاد مقاومت کرده و اثرات کمکی آن کاهش می‌یابد.

**روش مصرف مناسب این دارو:**  
هیچنیسته از دارو را در این طبقه شستور پیشک خود مصرف و در صورت عدم اطمینان با یکسانک یا داداواس خود شستور نمایید. بیکسان کان با توجه به شرایط شما خواهد گفت که چه تعداد دارو در چه زمانهایی از شبانه روز مصرف نمایید. این دارو